



Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Кафедра Психиатрии, наркологии, детской психиатрии,
медицинской психологии и психотерапии

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ



докладчик: ассистент кафедры Матвеева Анастасия Александровна
Научный руководитель: д.м.н. Абдуллаева Василя Каримбековна

18.09.2020 год. г. Кемерово

Актуальность

Микросоциальное взаимопонимание - одно из приоритетных механизмов реализации социального функционирования, следовательно, умение «читать» эмоции других людей и адекватно проявлять собственные - является важным фактором реабилитации, а именно социализации больных параноидной шизофренией. Однако данный аспект остается недостаточно изученным (О.В. Рычкова, Н.А. Соина, Г.Л. Гуревич 2013г.)

Впервые термин “эмоциональный интеллект” был употреблен в 1990 году Дж. Мейером и П.Саловеем. Одно из определений эмоционального интеллекта,, звучит как “способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; а также способность управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному росту” личности



очень важно понимать, что эмоциональный интеллект это не противоположность интеллекту, не триумф разума над чувствами, это уникальное пересечение обоих процессов».




Составляющие ЭИ в модели способностей Сэловея и Мейера 1997г

восприятие
и выражение эмоций
их идентификация

повышение
эффективности
мышления с
помощью эмоций


понимание своих и
чужих эмоций

управление
эмоциями



Цель исследования

- ▶ изучить особенности эмоционального интеллекта у больных параноидной шизофренией, включая его экспрессивный и импрессивный компоненты для оптимизации оказания медико-психологической помощи данному контингенту пациентов




Материалы и методы


128 больных параноидной шизофренией в возрасте 25-50 лет находящихся на стационарном лечении в Городской клинической психиатрической больнице

«Эмпатия», «Распознавание эмоций других людей», «Запрет на выражение чувств» (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, 2006), «Проективный тест враждебности» (Н.Г.Гаранян, А.Б.Холмогорова, 2006)

Длительность заболевания




Управление собственными ЭМОЦИЯМИ




Показатели эмоционального интеллекта коррелировали с гендерными признаками, так бальный показатель домена «Управление собственными эмоциями» у респондентов женского пола был значительно ниже

Эмпатия




Сравнительный анализ уровня домена «Эмпатия» мужчин и женщин показал значительное снижение показателей у мужчин.

Распознавание эмоций других людей



В группе лиц с длительностью заболевания более 10 лет домен «Распознавание эмоций других людей» был снижен и у 14% человек носил гротескный характер.

Управление собственными ЭМОЦИЯМИ



В зависимости от длительности заболевания наблюдается тенденция к изменению преобладающих показателей эмоционального интеллекта. Так в группе лиц с длительностью заболевания до 10 лет домен «управление своими эмоциями» был гораздо снижен,

Выводы:

- ▶ снижение показателей эмоционального интеллекта у больных параноидной шизофренией имеет связь с отдельными клиническими проявлениями болезни, такие как оскудение в эмоциональной сфере, эмоциональная тупость и нарастание апатии и негативной симптоматики. У пациентов параноидной шизофренией установлены значительные нарушения импрессивного компонента эмоционального интеллекта, представленные затруднениями в распознавании эмоций других людей по мимическим и пантомимическим проявлениям. Полученные в работе данные о нарушенных и сохранных звеньях эмоционального интеллекта могут использоваться для оптимального выбора психокоррекционных и реабилитационных технологий, а также для более точного прогнозирования ожидаемой эффективности психотерапевтических интервенций и перспектив социальной адаптации пациентов в зависимости от их индивидуально-личностных особенностей